

OMK2[®]

Citicolină, Vitamina B12, acid hialuronic
Flacon de 10 ml e

Compoziție:

Sare monosodică de citicolină, ciancobalamină (Vitamina B12), acid hialuronic, fosfat de sodiu monobazic monohidrat, fosfat de sodiu dibazic dodecahidrat, clorură de sodiu, clorură de benzalconiu, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată OMK2[®]

OMK2[®] este o soluție oftalmică sterilă, într-un flacon de 10 ml.

Ce este

OMK2[®] este o soluție oftalmică ce conține citicolină 2% și acid hialuronic cu greutate moleculară mare 0,2% și Vitamina B12.

Datorită prezenței Citicolinei, OMK2[®] asigură un suport structural util și benefic pentru refacerea integrității membranei celulare lezate de afecțiuni degenerative ale ochiului, cum ar fi retinopatia diabetică incipientă.

Ciancobalamina (Vitamina B12) favorizează creșterea celulelor epiteliale corneene și totodată protejează celulele împotriva radicalilor liberi.

Mai mult, soluțiile care conțin acid hialuronic sunt capabile să creeze un micromediu favorabil proceselor de vindecare a suprafeței oculare în caz de leziuni ale epiteliului cornean sau conjunctival.

De fapt, acidul hialuronic care este obținut prin sinteză biotehnologică ce dă naștere unei soluții mucomimetice, mucoadezive și vâscoelastice, capabilă să îmbunătățească stabilitatea filmului lacrimal și în acest fel menține suprafața ochiului lubrifiată, hidratată și protejată.

Când trebuie utilizat OMK2[®]

OMK2[®], datorită prezenței Citicolinei și a acțiunii sale asupra structurii celulelor ganglionare retiniene, este recomandat pacienților cu retinopatie diabetică incipientă.

În plus, OMK2[®], datorită prezenței Vitaminei B12, stimulează indirect procesul fiziologic de re-epitelizare corneană după intervenții chirurgicale, LASER sau mici escoriații ale suprafeței corneene.

În plus, proprietățile hidratante și protectoare ale OMK2[®] asigură ameliorare în cazul senzațiilor de iritație, arsură sau corp străin produse de factori de mediu sau utilizare excesivă a terminalelor video.

Cât și cum se utilizează OMK2[®]

1 picătură de 3 ori pe zi, în funcție de necesitate.

Precauții și atenționări

- Nu utilizați în cazul în care flaconul este deteriorat.
- Nu utilizați în cazul alergiei la oricare dintre ingrediente.

- Nu utilizați după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
- Evitați contactul ochiului cu vârful recipientului.
- După utilizare poate apărea o închețoare temporară a vederii. Se sugerează să așteptați câteva secunde înainte de a începe orice activitate care necesită claritate vizuală.
- Așteptați 10-15 minute după utilizare înainte de a instila alte produse medicinale oftalmice cu administrare locală.
- Produsul trebuie utilizat în decurs de 30 zile de la prima deschidere.
- A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor.
- Produsul este dedicat exclusiv utilizării oftalmice externe.
- A se păstra la temperaturi sub 25°C.
- A nu se arunca flaconul în mediul înconjurător după utilizare.

Producător:

Omikron Italia S.r.l.- Viale B. Buozi, 5 – 00197 Roma, Italia

Distribuitor:

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL, Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 2, din incinta Expo Business Park, etaj 7, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 012095, Tel: +4 0372 502 200, Fax: +4 0372 502 255

Data ultimei revizuri a prospectului: iulie 2017

Patent Internațional și Național

